

ZASEBNI ŠOLSKI DISPANZER
JELKA HOSTNIK, dr.med.
specialistka šolske medicine

OBVESTILO STARŠEM UČENCEV 3. RAZREDOV

Vaš otrok _____ bo imel-a sistematični zdravniški pregled dne _____ ob _____ uri v Zasebnem šolskem dispanzerju v prostorih ZD Kranj. Po pregledu bo cepljen proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju v enem cepivu. Sledilo bo še kratko predavanje o zdravstveni vzgoji.

OTROK MORA ZAJTRKOVATI!

Prosimo, da prinese k pregledu:

- kartico zdravstvenega zavarovanja
- knjižico o cepljenju
- to obvestilo z vašim podpisom

CEPLJENJE JE PO ZAKONU OBVEZNO!

Razlogi za opustitev cepljenja:

- alergija na sestavine cepiva,
- resen nezaželen učinek cepiva po predhodnem odmerku istega cepiva,
- bolezen in zdravstveno stanje, ki je nezdržljivo s cepljenjem.

Vsakega otroka pred cepljenjem pregledam. Če je otrok bolan, lahko prestavim cepljenje za 1-2 tedna. Smrkanje, kašljanje brez prizadetosti otroka ponavadi ni razlog za prestavljanje cepljenja.

IZPOLNITE PRESEJALNI VPRAŠALNIK, KI JE PRILOŽEN.

Otroka cepimo v ordinaciji po opravljenem zdravniškem pregledu in pregledu zdravstvene dokumentacije. Zdravnik vsakič sproti odloči ali bo otrok cepljen takoj oz. če bo cepljenje prestavljeno. V tem primeru določimo nov datum cepljenja. Cepljenje opravi za to usposobljena medicinska sestra. Cepimo v deltoidno mišico (zgornja tretjina nadlahti). Vbod je lahko malo boleč. Po cepljenju mora otrok počakati vsaj pol ure v čakalnici. V primeru, da pride do hujše alergijske reakcije, ki je sicer zelo redka, lahko otroku takoj ustrezno pomagamo. Pri cepljeni osebi se ustvarijo protitelesa, to so beljakovine, ki ščitijo pred okužbo. V zelo redkih primerih lahko cepljena oseba tudi zboli, če je organizem ustvaril premalo protiteles, vendar okužba nikoli ne poteka v težki obliki in s komplikacijami. Oseba, ki se ne cepi, je popolnoma nezaščiten pred okužbo.

OBRNITE LIST!

V stiku z okuženim bo zbolela. Potek bolezni je nepredvidljiv, poteka lahko s komplikacijami, ki ogrozijo življenje ali povzročijo trajno okvaro zdravja. Cepivo je varno in kakovostno. Kljub temu so možni neželeni učinki po cepljenju. Pogostejši so blagi neželeni učinki na mestu cepljenja: bolečina, oteklina, rdečina ali redkeje modrica. Trajajo lahko nekaj dni. Na boleče mesto položite hladne obkladke. Resni neželeni učinki cepljenja so zelo zelo redki: visoko povišana telesna temperatura, krči, nenavadno vedenje otroka, encefalitis (vnetje možganov) ter poškodbe možganskih in perifernih živcev. V teh primerih morate takoj obiskati zdravnika.

Če želite več informacij o cepivu in dodatne podrobnosti v zvezi s cepljenjem, pokličite na telefonsko številko 04-20-82-141 v sredo med 11:30 in 12:30.

Hvala za sodelovanje.

To navodilo in soglasje sem prebral-a, ga razumel-a in s svojim podpisom pristajam na cepljenje svojega otroka.

Datum:

Podpis: